

# 子猫を 拾ったら 飼い始めたら



AKEBONO ANIMAL CLINIC  
あけぼの動物病院

## 猫を飼うときに 必要なもの・あったらいいもの



トイレ

数カ所多めに(猫の数+1)  
あると理想的です



猫ドーム

猫は箱っぽいのに入りたが  
ります。隠れる場所を作って  
あげてください。



フード

子猫用で総合栄養食と  
記載があるものを使い  
ましょう。



猫じゃらし

先端は**固定**のものよりゴ  
ム紐などで動くものの方  
が喜びます。  
ゴム紐は食べてしまわな  
いように遊んだ後は片付  
けましょう!



キャリー

上から出し入れできるキャリ  
ーがオススメです。  
横からだけだと病院での出し入  
れに苦労することがあります。



爪研ぎ

段ボール製のを気に入  
る子が多いです。



ヒーター

冷えると具合が悪くなりま  
す。猫ドームやダンボールの下に入  
れてあげると良いです。

## 猫が食べると危険なもの



人用のサプリメント

中には危険なものがあります。  
例えばαリポ酸は猛毒です



ネギ類

赤血球が壊れて貧血  
になってしまいます



人用の薬

特に解熱剤で危険なこと  
で有名なものがあります。た  
った1錠で死亡しかねません



BATTERY  
不凍液

エチレングリコールが含まれて  
いることが多いです。  
急性腎不全を起こし、死亡します。



観葉植物

大体の観葉植物は避けるべき  
です。特にユリは急性腎不全を  
起こし、死亡します。花瓶の水を  
飲むだけでもダメです。

\*他にもありますが、よくあるものをあげました。  
詳しくはご相談ください。

## 猫のだいたいの年齢

～3日齢

まだへその緒がついている  
頃です。

体重の目安はこちら  
フロントラインプラスのページに飛びます



10日齢

目が開く頃です。  
クリッとした目が可愛い頃  
です。



21～28日齢

乳歯が生えそろう頃です。  
この時期までには哺乳瓶をやめて  
フードに変えましょう。  
最初はミルクと混ぜたり、缶詰・  
パウチでもOKです。  
トイレもこの辺から置いておいて  
いいでしょう。



2ヶ月齢

初回ワクチンの時期です。  
この頃からお母さんからの免疫の  
効果が低下してくる子があります。




6ヶ月齢

永久歯になる頃です。  
去勢・避妊手術が可能な時期です。  
歯の生え替わりがムズ痒くて口を  
気にする子もいます。



## 『すぐ』にすること

### ・暖める



子猫は小さいうちは体温調節が下手  
っぴサンです。  
冷えてしまわないように、毛布を  
着せてあげたり、湯たんぽで外から温  
めてあげたりする必要があります。  
目安は、生まれたてで30~35°C、  
目が開いたくらいの子で28~30°C  
くらいが良さそうです。  
暑すぎると逆に消耗するので温度計  
も利用しましょう。

### ・食欲があるか確認する

小さいうちは肝臓が未発達でエネルギーを備  
蓄できている量が少ないです。  
そのため頻回に食事を取る必要があります。  
6ヶ月を過ぎるまでは3~4回は与えた方が良  
いです。



**\* 食べない時はもう赤信号です！！  
すぐに病院で対処しましょう！**

### ・先住動物と隔離




特に先住動物がノミ・ダニの予防が不  
完全、先住猫さんがワクチンが不完全  
な場合は注意しましょう。

ノミ・ダニは仮に接触させなくても先  
住動物、新入りさん共に対処した方が  
良いでしょう。

先住猫さんの場合には猫エイズ・猫白  
血病ウイルスにも注意が必要です。

## その日か次の日にすること

早めに病院を受診しておきましょう！  
ワクチン・寄生虫など予防できる病気  
の知識を早めに仕入れておきましょ  
う！



## 最初の1週間

初診の時に体調不良があれば、そちら  
の治療を優先します。  
家に来て10日以内の体調不良であ  
ればパルボウイルスの検査を行います。



お腹の虫を便で調べます。  
ある程度の量があったほうが検出しや  
すいです。  
検便の寄生虫検出率はタイミングにも  
影響されたり、100%出なかったりす  
るので、複数回の検査を行ったり、検  
出されなくても駆除薬を使うこともあ  
ります。(寄生していないのに投薬し  
ても特に害はありません)

ノミ・ダニの予防薬を使います。

できるだけ元気な時に使用しますが、  
家庭内の蔓延防止や、ノミ寄生によ  
って体調を崩しているような場合にはす  
ぐに使用することもあります。



家庭で、先住猫さんと完全な隔離ができ  
ない場合は、猫エイズ・猫白血病ウイルス検査  
を行います。

感染の有無をより正確に検査するには、新  
規の感染の可能性が無くなってから2ヶ月以  
上後が理想です。初診時の検査で陰性であ  
っても再検査をお勧めします。

猫白血病の主な  
感染経路



猫エイズの主な  
感染経路



## お家に慣れてきたら 2ヶ月齢くらいになったら



ワクチンを接種しましょう。  
8週齢から3~4週おきに接種します。  
16週齢を超えてから最後の接種をしましょう。  
  
だいたい2、3、4ヶ月齢の3回接種すること  
になります。

## ワクチンで予防できる病気



猫パルボウイルス感染症  
子猫のうちにかかってしまうと死亡率90%と  
も言われます。発熱、嘔吐、下痢などの症状  
を起こします。ウイルスは消毒に強くアルコ  
ールでは効果がありません。

猫カリシウイルス・猫ヘルペスウイルス感染症  
風邪症状を起こすウイルスです。  
カリシウイルス感染症では重度になると肺炎も起  
こします。他のカリシウイルス感染症の特徴的な  
症状として口内炎があります。



## そのほかの予防



交通事故ほか  
外には危険がいっぱいです。  
ケンカ、感染症など・・・外には出さないこと  
をオススメします。

## 猫もフィラリア予防！

猫も犬ほどではないですがフィラリアにかかり  
ます。かかると心臓が小さいので一大事になり  
ます。症状は咳、嘔吐などです。  
重篤化した時は急死します！



避妊・去勢手術  
6ヶ月齢くらいから実施できます。  
女の子は子宮の病気と早期なら乳腺腫瘍も  
発生を抑えられるという報告があります。

